



## **RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ASMA Y ALERGIA PEDIÁTRICA SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN NIÑOS CON ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE HUEVO**

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Asma y Alergia Pediátrica (SEICAP) en el caso de que se indique la administración de la **vacuna antigripal (campaña 2013-2014)** en niños con Alergia a Huevo, realiza las siguientes **RECOMENDACIONES**:

- 1.- Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con reacciones anafilácticas graves tras la administración de una dosis previa de vacuna antigripal.
- 2.- Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con reacciones anafilácticas graves después de la ingesta de huevo. Si se considera que la vacunación es necesaria, esta deberá administrarse, previa valoración por un alergólogo o alergólogo pediatra, en un centro hospitalario con los medios adecuados para el tratamiento de la anafilaxia.
- 3.- En el caso de reacciones no graves tras la ingesta de huevo se podrá realizar la vacunación antigripal con las siguientes recomendaciones:

**3.1.-** La vacuna antigripal puede administrarse en su centro habitual.

**3.2.-** No es necesaria el fraccionamiento de la dosis de la vacuna pudiendo administrarse en una dosis única.

**3.3.-** Se aconseja un periodo de observación de 30 minutos después de su administración.

4.- Los pacientes con pruebas sugestivas de Alergia al huevo que no lo han introducido aún en su dieta, deberán consultar con un alergólogo pediátrico antes de administrar la vacuna de la gripe"

La SEICAP estima que sería necesario que en la ficha técnica de las vacunas antigripales estuviera reflejado el contenido de ovoalbúmina por dosis de vacuna.

**GRUPO DE TRABAJO DE ALERGIA ALIMENTARIA DE LA SEICAP**

# PROTOCOLO VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN NIÑOS ALÉRGICOS A PROTEÍNAS DE HUEVO

NIÑO CON ALERGIA A PROTEÍNAS DE HUEVO

ANTECEDENTES DE REACCIÓN ANAFILÁCTICA PREVIA TRAS ADMINISTRACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL

SI

NO

CONTRAINDICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL

ALERGIA ALIMENTARIA A HUEVO CON CLÍNICA NO ANAFILÁCTICA

ALERGIA ALIMENTARIA A HUEVO CON CLÍNICA ANAFILÁCTICA

ADMINISTRACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL

En contra de la piel de vacunación  
Una única dosis  
Observación 30 min

DERIVACIÓN A ALERGOLOGO INFANTIL PARA EVALUACIÓN

Sospecha de alergia a huevo (prick y/o CAP positivo) en paciente sin ingesta previa de huevo